

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA VITE n° 03 del 04 aprile 2025

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Le previsioni a medio termine indicano per la nostra Regione una sostanziale stabilità meteorologica con assenza di precipitazioni significative per almeno 10 giorni. Dal fine settimana si registrerà un abbassamento termico importante con conseguenze incerte rispetto alla possibilità di gelate per lunedì mattina.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

Le varietà a germogliamento precoce quali Glera e Chardonnay presentano un BBCH medio rispettivamente pari a 7 e 6, con valori massimi rispettivamente di 13 e 9. Il Pinot grigio presenta BBCH medio fra 5 e 6.

Si nota maggiore disformità di germogliamento nel Glera rispetto alle altre varietà precoci. Una percentuale fra il 7 e l'8% dei vigneti monitorati appartenenti a Glera presenta germogli con BBCH pari a 12, e quindi suscettibili a peronospora.

Per quanto riguarda le varietà tardive, il loro stadio vegetativo risulta compreso fra gemma cotonosa e inizio germogliamento. Una descrizione delle diverse fasi di sviluppo secondo l'indice BBCH è presente al seguente link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/vite/BBCHvsBaggioliniDefinitivo.pdf>

Le successive immagini (foto da 1 a 4) riportano alcuni esempi riguardanti lo sviluppo fenologico relativo alle varietà più diffuse, raccolte durante i rilievi effettuati nella giornata di ieri.



Foto 1: Glera



FOTO 2: Chardonnay



FOTO 3: Pinot grigio



FOTO 4: Merlot

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora e Oidio

Considerata la fenologia delle varietà precoci e l'andamento meteorologico, al momento non è necessario intervenire contro questi patogeni.

Escoriosi

Il patogeno sverna prevalentemente sulla parte basale (primi internodi) dei capi a frutto sotto forma di picnidio. Le infezioni iniziano in primavera, in presenza di temperature superiori a 1 °C, ed al verificarsi di eventi piovosi e bagnature fogliari persistenti.

I sintomi si manifestano con placche nere, screpolature longitudinali, fessurazioni profonde e suberificazioni concentrate prevalentemente nei primi internodi basali dei capi a frutto.

Concentrandosi sulla parte basale, le forme di allevamento a potatura corta risentono maggiormente della malattia.

Il patogeno attacca qualunque organo (foglia, germoglio, grappolo), causando sviluppo stentato, avvizzimenti, sino a giungere, nei casi più gravi, ad accecare le gemme basali. Attualmente le condizioni climatiche non sono favorevoli all'instaurarsi di infezioni.

Fitofagi

Cocciniglie

Si rimanda a quanto riportato all'interno del precedente bollettino (Bollettino difesa vite bio n. 02 del 28 marzo 2025).

Insetti gemmivori

Si consiglia di effettuare un accurato monitoraggio nei vigneti dove negli anni scorsi si sono verificati danni da nottue o da geometridi (rosure delle gemme nella fase del cotone).

In presenza di danni si invita a confrontarsi con i tecnici di riferimento per valutare eventuali strategie di lotta.

Tignole della vite

Nei giorni scorsi si sono registrate le primissime catture di tignoletta della vite negli areali più precoci della regione (zona orientale). **Per le aziende che intendono utilizzare il metodo della confusione sessuale questo è il momento ideale per applicare gli erogatori in campo (foto 5) per evitare i primissimi accoppiamenti.**

FOTO 5: erogatore correttamente installato.



GESTIONE AGRONOMICA

Sfalcio erba e trinciatura sarmenti

Il Tarassaco (dente di leone), si trova nella fase di piena fioritura.

Pertanto, si sconsiglia vivamente di intervenire in questa fase con sfalci di erba o trinciatura sarmenti per non sottrarre un importante fonte di approvvigionamento di nettare e polline per i pronubi e l'entomofauna utile.

Si consiglia di tenere monitorate nei prossimi giorni le previsioni metereologiche ed in particolare il rischio gelate, rammentando che l'OSMER mette a disposizione l'indicazione relativa a tale evento al seguente indirizzo: <https://www.osmer.fvg.it/gelate.php>. Qualora la probabilità risultasse medio/alta, ci riserviamo di pubblicare un avviso riguardante lo sfalcio dell'erba, operazione che riduce il danno nel caso in cui si verifichi l'evento sfavorevole.

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...".

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi, diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA

Informiamo che per l'anno 2025 AIAB FVG con il supporto di ERSa, offre l'opportunità di usufruire di un'assistenza tecnica gratuita non continuativa alle aziende site sul territorio regionale che seguono il metodo biologico o che sono interessate alla conversione a tale metodologia di coltivazione nei settori: seminativi, orticoltura, frutticoltura e viticoltura. Per maggiori informazioni è possibile contattare i tecnici di riferimento:

Federico Tacoli: 327 7882469

Gibil Crespan: 333 7338753

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSa ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSa FVG Bollettini vite produzione biologica
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSa_vite_BIO

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.