

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA VITE
n° 10 del 30 aprile 2025**

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Fino alla giornata di domenica le previsioni meteorologiche indicando tempo sereno con temperature al disopra della media per il periodo. Domenica pomeriggio possibile instabilità con brevi e locali piogge. Da lunedì si attendono rovesci per i primi giorni della settimana.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

Lo sviluppo fenologico progredisce con un aumento medio settimanale di 1 o 2 punti BBCH. Per quanto concerne le varietà precoci quali Glera e Chardonnay si assiste ad un BBCH medio pari a 16 e massimo pari a 18 con infiorescenza in fase di ingrossamento. Il Pinot grigio presenta valori di BBCH medio pari a 15 con massimi pari a 17 con un avanzamento più marcato rispetto alle varietà precoci, infiorescenza ad inizio ingrossamento. Per quanto concerne le tardive in osservazione, Merlot e Tocai si presentano con BBCH medio pari a 14 con punte di 16.



Foto 1 e 2 Germoglio di Pinot Grigio e Infiorescenza 28/04/2025

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora e Oidio

Ad oggi si riscontrano le prime sporadiche macchie d'olio con sporulazione sui testimoni non trattati. I vigneti trattati continuano a non manifestare sintomi riconducibili ad infezioni primarie da peronospora. Rari a livello territoriale e limitati a vigneti storicamente colpiti quelli relativi all'oidio. Per tale ragione, non è necessario ripristinare immediatamente la copertura, qualora dilavata o proteggere la vegetazione originatasi successivamente all'ultimo trattamento effettuato. **Ma è importante intervenire il più possibile a ridosso delle prossime piogge** secondo quanto disposto nel precedente **avviso di trattamento del 28 aprile**. Si raccomanda di seguire attentamente l'evoluzione delle previsioni meteorologiche, al fine di collocare correttamente l'intervento previsto.

Il posizionamento risulta di fondamentale importanza per garantire l'efficacia dell'intervento anche in virtù dei rapidi accrescimenti a cui si assiste in questi giorni in funzione dell'elevata disponibilità idrica e delle alte temperature.

Escoriosi

Presenti sul territorio i sintomi relativi a questa crittogama ma con diffusione ed intensità limitate. In caso di sintomi diffusi si consiglia di consultare i tecnici di riferimento.

Fitofagi

Tignole della vite

I voli di tignoletta (*Lobesia botrana*) proseguono, ma sono in calo rispetto alla settimana precedente. Sono state riscontrate catture in circa la metà dei siti monitorati a livello territoriale. Le stazioni di Mortegliano, Cordenons, San Quirino, Maniago, Cividale e San Pier d'Isonzo risultano avere raggiunto i valori più elevati di catture totali sino ad oggi. Nelle stazioni di riferimento bio poste a Sacile, Casarsa, Codroipo, Lauzacco, Pradamano e Romans d'Isonzo non si riscontrano catture. Per quanto concerne la tignola (*Eupoecilia ambiguella*), si segnalano catture limitatamente alla stazione di Moruzzo.

Erinosi

Si rilevano sul territorio sintomi diffusi a carico della vegetazione dovuti alla presenza di eriofidi (*Colomerus vitis*), caratterizzati dalle classiche bollosità sulla pagina superiore delle foglie e la presenza di un tessuto tomentoso nella pagina inferiore delle foglie. La problematica generalmente non desta preoccupazioni e regredisce all'avanzare dello sviluppo della vegetazione. In caso di sintomatologia particolarmente intensa con arresto vegetativo si consiglia di consultare i tecnici di riferimento.



Foto 3 sintomi di erinosi della vite

Cocciniglie

In alcuni vigneti, si riscontrano sia femmine non mature e che femmine in fase di ovideposizione di *Parthenolecanium corni*. Anche la presenza di formiche sul ceppo o di colonie di formiche ai piedi delle viti è un indicatore della possibile presenza di cocciniglie, perciò in caso si riscontrassero si consiglia di monitorare con attenzione il vigneto. In questo momento non sono consigliabili interventi, che sarà meglio attuare alla comparsa dei giovani nelle prossime settimane.



Foto 4 Femmina matura di *P. corni* con presenza di formiche



Foto 5 Femmina immatura di *P. corni*

GESTIONE AGRONOMICA

Potatura Verde

Con l'avanzare della fase fenologica è giunto il momento di eseguire, soprattutto per le varietà precoci, le operazioni di potatura verde tipiche del periodo: spollonatura, scacchiatura e selezione dei germogli.

Tali operazioni assumono un ruolo ancora più significativo nei vigneti condotti con metodo biologico dove le pratiche agronomiche rappresentano la chiave di volta della difesa fitosanitaria e allo stesso modo permettono di seguire in modo armonico lo sviluppo del vigneto favorendo lo snellimento della gestione: minore suscettibilità alle patologie e maggiore semplicità della gestione in seguito alla loro esecuzione.

In particolare il diradamento dei germogli della testa di salice, o di strutture analoghe, permette se gestito con sapienza e tempestività di ottenere svariate ricadute positive sulla conduzione del vigneto quali: ottenimento di una chioma meno compatta e caratterizzata da minori bagnature fogliari e umidità relativa e quindi meno soggetta all'attacco da parte di agenti patogeni e parassiti, più facile da penetrare con i trattamenti fitosanitari. La rimozione di germogli superflui a vantaggio dello sviluppo di quelli rimanenti permette un forte risparmio di tempo nella potatura

invernale, che risulta meno traumatica per la pianta stessa in quanto i tagli al bruno sono ridotti allo stretto indispensabile (foto 6 e 7). Tutto ciò comporta anche uno snellimento della gestione del vigneto in quanto saranno necessarie meno cimature, diradamenti, sfogliature e altre pratiche per la regolazione della chioma.



Foto 6 e 7 Vite sottoposta all'operazione di selezione dei germogli

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...".

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi, diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA

Informiamo che per l'anno 2025 AIAB FVG con il supporto di ERSa, offre l'opportunità di usufruire di un'assistenza tecnica gratuita non continuativa alle aziende site sul territorio regionale che seguono il metodo biologico o che sono interessate alla conversione a tale metodologia di coltivazione nei settori: seminativi, orticoltura, frutticoltura e viticoltura. Per maggiori informazioni è possibile contattare i tecnici di riferimento:

Federico Tacoli: 327 7882469

Gibil Crespan: 333 7338753

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSA FVG Bollettini vite produzione biologica
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_BIO

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.